


Rotavirová infekce může postihnout **kterékoliv dítě** a při **těžkém průběhu** může **ohrozit jeho zdraví i život.**

**Nejúčinnější možností
prevence je očkování.**



RotaTeq je určen k aktivní imunizaci kojenců ve věku od 6 týdnů za účelem prevence gastroenteritidy způsobené rotavirovou infekcí. Vakcína RotaTeq se podává perorálně ve 3 dávkách. První dávku lze podat od věku šesti týdnů a ne později než ve věku 12 týdnů. Všechny tři dávky by měly být podány do věku 32 týdnů.

Zeptejte se svého lékaře na indikace, kontraindikace a nežádoucí účinky. Tak jako všechny očkovací látky, ani vakcína RotaTeq nemusí plně ochránit každého.

**Zeptejte se svého dětského lékaře
na očkování vakcínou RotaTeq.**

Nechte své dítě včas očkovat.

**Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.
Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen
z prostředků veřejného zdravotního pojištění.**

RotaTeq  [®]

perorální roztok

Očkovací látka proti rotavirům, živá



Copyright © (2012) Merck & Co., Inc. Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme, s.r.o., Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6
Tel.: 221 771 250, Fax: 224 214 901

04-2014-VACC-1035269-0000